

キャッチ・適応

炭酸ガスレーザー治療のご案内

ホクロ

イボ

盛りあがったシミ

スキンタッグ

その他の
隆起性皮膚病変



導入

ホクロやイボは、メイクでも隠しきれず、年齢よりも老けて見られたり、コンプレックスと 感じている方も少なくありません。

現在では、メスを使わずに、レーザーによってホクロやイボ等を取り除くことができます。出血が少なく、あとに残りにくいのが特長です。

当院では、ホクロやイボの治療に適しているといわれている炭酸ガスレーザーを用いて治療を行っております。詳しい治療については、当院の医師または スタッフまでお気軽にお尋ねください。

このような症状に炭酸ガスレーザー治療が適しています。

- ホクロ
- シミ（盛り上がったもの）
- イボ
- スキンタッグ
- その他の隆起性皮膚病変

治療の流れ

1. 診察
症状や皮膚の状態を診察します。
2. 消毒・麻酔
治療する部位を消毒し、麻酔をします。
症状によっては麻酔をしない場合もあります。
痛みに弱い方は、医師にご相談ください。
3. 照射
レーザーを照射します。
数分で照射が終わります。
4. 保護
薬を塗り、絆創膏で保護します。
絆創膏を貼る期間は医師の指示に従ってください。
5. 再診
治療した部位の状態を診察します。

※ 治療の流れは、医療機関によって異なることがあります。



治療後の注意点

治療した部位は、かさぶたになります。
かさぶたは、触ったり無理に取ったり刺激を与えないようにし、
日焼けをしないようにしましょう。

かさぶたが取れた後は、一時的に赤みが続いたり、まれに色素沈着
になることがあります。詳しくは、医師にご相談ください。

よくある質問

Q. 痛みや出血はありますか？

A. 麻酔をするので、痛みはほとんど感じません。
また、出血もほとんどありません。

※痛みに弱い方は、医師にご相談ください。

Q. 1回で治りますか？

A. 通常は1回ですが、治療する部位が多い場合や
大きさ、深さによって、数回に分けて治療する
こともあります。

Q. 治療後、メイクはできますか？

A. メイクはできますが、治療した部位はかさぶたが
取れてから、メイクをするようにしてください。

Q. かさぶたは、どのくらい取れますか？

A. 治療した大きさや深さによって異なりますが、
通常は、1~2週間ほどでかさぶたが取れます。

Q. 治療後、注意することはありますか？

A. 絆創膏は、医師の指示があるまで取らないでください。
絆創膏を取った後は、こすったり日焼けをしないように
してください。その他、医師の指示がある場合はそれに
従ってください。

